




ANFIBIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERIA (I) ADULTOS

Sapo partero bético (*Alytes dickhilleni*)



Sapo pequeño 5-6 cm. Color terroso. Piel granulosa. Pupila vertical. Iris dorado con líneas negras. El tímpano es visible.

Se reproduce en arroyos, fuentes, balsas y abrevaderos. Tras la reproducción, el macho se hace cargo de los huevos. Los engancha a sus patas traseras y carga con ellos durante un mes aproximadamente.



Presente en las grandes sierras almerienses: Sierra de Gádor, Nevada, Filabres, Lúcar, Estancias y Maria.



Macho acarreado huevos


Sapillo moteado (*Pelodytes punctatus*)



**Pequeño, 4 cm. Cabeza aplastada.
Pupila vertical. Tímpano poco visible.
Color verdoso.**

**Es muy característico la presencia de
gran cantidad de verruguitas de color
verde oliva.**

**Preferentemente en charcas ganaderas
grandes. También arcenes inundados y
acequias. Raramente en balsas de
riego.**



**Escaso. Tan solo común en
los Vélez. Poblaciones
aisladas en el Levante
almeriense (Bédar y
Sorbas).
Puntual en Filabres y Sierra
Nevada.**



Sapillo pintojo meridional (*Discoglossus jeanneae*)



Parecido a una rana pero con tímpano no visible. Pupila redondeada. Mancha negra detrás del ojo creciente. La piel es lisa, aunque presenta pequeñas verruguitas alineadas longitudinalmente a lo largo del dorso. La coloración es muy variable.

Preferentemente en charcas temporales. Más raramente en pequeños arroyos y fuentes.




En claro retroceso. Actualmente muy escaso. Presente en la Contraviesa, Sierra de Gádor, Filabres, Los Vélez y levante almeriense. Poblaciones aisladas.



Forma rayada

Sapo de espuelas (*Pelobates cultripes*)



Sapo rechoncho, de piel lisa. Coloración pardo grisácea o amarillenta con manchas más oscuras irregulares, unidas entre sí. **Pupila vertical.** Fácil de diferenciar porque en las patas posteriores, presentan un **tubérculo córneo de color negro**, las espuelas, que utiliza para enterrarse en pocos minutos.

Se reproduce charcas ganaderas de gran tamaño, semipermanentes. Muy raramente en balsas de riego.




Muy escaso. Tan solo en la Comarca de los Vélez. Hay poblaciones a los pies de Sierra Nevada, cerca de Fiñana, aunque ya en la provincia de Granada.



Espolón trasero

Ranita meridional (*Hyla meridionalis*)



Rana pequeña (3-4 cm).

Piel lisa de color verde brillante, verde claro o pardusco, de tono normalmente uniforme. Presenta una banda oscura desde la nariz hasta aproximadamente la zona axilar. Dedos engrosados a modo de ventosas que le sirven para trepar.


En lagunas, charcas y pequeños arroyos, por lo general con abundante vegetación de ribera.



En Declive. Tan solo en la Albufera de Adra, río y vega de Adra. Parece extinguido del levante almeriense (desembocadura de los ríos Aguas y Almanzora).



Sapo común (*Bufo spinosus*)



El anfibio de mayor tamaño en Almería, hasta 18 cm. Piel gruesa y rugosa cubierta por frecuentes y grandes verrugas. Glándulas parotídeas visibles. Iris rojizo y pupila horizontal. Coloración parda-rojiza, normalmente amplias manchas amarillentas o blanquecinas.

Se reproduce en balsas, charcas, fuentes, abrevaderos... siempre en zonas de aguas permanentes o semipermanentes.



Potencialmente en toda la provincia, aunque es más frecuente en las montañas. Muy raro en zonas costeras y/o áridas como el desierto de Tabernas o la Sierra de Gádor.



Pareja en amplexo

Sapo corredor (*Bufo calamita*)



Tamaño mediano, 7-9 cm. La piel es muy verrugosa. Glándulas paratoideas muy visibles y paralelas. Iris amarillento y pupila horizontal. Color variable, generalmente verde grisáceo a marrón, alternada con manchas claras. Presenta una línea amarilla en la espalda.


Especialista de charcas temporales. También en ramblas y balsas.



Potencialmente en toda la provincia, aunque es más frecuente en zonas costeras y áridas, al contrario que el sapo común. Frecuente en Tabernas, Cabo de Gata y Sierra de Gádor.




Rana común (*Pelophylax perezi*)



Rana de tamaño mediano, de hasta 11 cm. Pupila redondeada. La coloración es muy variable, aunque suele ser verde o parda, con manchas negras. Muchas veces presenta una línea dorsal clara. El tímpano es muy visible. Pliegues dorsolaterales muy desarrollados.

El más acuático de nuestros anfibios. Fundamentalmente en zonas de aguas permanentes: arroyos, balsas de riego, etc.



Presente en toda la provincia. Común en zonas agrícolas, donde son abundantes las balsas de riego. Más raro en la montaña.

